



COPYRIGHT ©2024

新泽西消化内科中心 NEW JERSEY DIGESTIVE DISEASE ASSOCIATES

247 BRIDGE STREET, BUILDING G
METUCHEN, NJ, 08840

29 COLUMBIA TURNPIKE, SUITE 202
FLORHAM PARK, NJ, 07932

TEL: 732-662-5115 FAX 732-362-4619 www.njdda.com Email: njddageneral@gmail.com

姓: _____ 名: _____ 日期: _____ 时间: _____ 如有调整, 请以最后通知时间为准

地址: METUCHEN 诊所 FLORHAM PARK 诊所

肠镜准备 (SUPREP)



术前门诊

有以下情况患者注意事项, 请在术前门诊和医生讨论, 并遵医嘱:

- 高血压: 请勿停止服用降压药, 肠镜检查当天用小口水送服;
- 糖尿病: 在肠镜检查前一天, 降血糖药物剂量减半, 或遵医嘱
- 服用抗凝血药的患者: 在做肠镜前 请遵医嘱停止服用抗凝血药 (例如 Coumadin, Plavix, xarelto)
- 服用铁剂的患者: 请在做肠镜检查前 4 天停止服用
- 其他情况:

肠镜前几天 请到药房取清肠药水: SUPREP

您可以吃早餐. 早餐之后直到肠镜前 2 小时, 您只可以进透明液体流食。

肠镜前一天

✓ 您可以吃早餐. 早餐之后直到肠镜前 2 小时, 您只可以进透明液体流食。



水



无果肉的果汁



柠檬汁



不加奶的咖啡或茶



清鸡汤



无添加的果冻

× 请勿饮用

- 奶
- 红色或紫色的液体
- 含酒精的饮料

晚上 19:00 完成以下 1-4 步:

肠镜前夜

第一步



将第一瓶药液 (6 OUNCE) 倒入容器中。

第二步



加清水到刻度线 (16 OUNCE) 稀释混匀药液

第三步



将容器中混匀稀释的药液喝完

第四步



在 1 小时内再用同一容器 (16 OUNCE) 喝两杯清水

肠镜当天

早上 重复以上 1-4 步喝完第二瓶药液

注意: 肠镜前 2 小时停止饮用水和透明液体, 最后一杯药液须在此之前喝完。当肠镜检查完成后, 不能自行驾驶汽车, 必须由亲友陪同回家。

胃肠镜当天相关要求

感谢您选择新泽西消化内科中心。为了您的健康, 我们需要您的配合来做到以下几点:

- 如果您有发烧, 咳嗽, 气喘, 近期住院, 请及时通知我们。您的胃肠镜有可能根据情况延期或取消;
- 到诊所请穿戴舒适, 最好戴口罩, 请勿携带个人贵重物品;
- 请您按预约时间到达。如有紧急情况, 需要改期或取消, 请拨打 732-662-5115;
- 准备好后我们会通知您进入。胃肠镜完成后我们会电话通知陪同者到门口接您;
- 胃肠镜两周后每位患者门诊复查, 医生会和您详细讨论结果和下一步诊疗计划。胃肠镜当天预约复诊时间。